

より詳しい

心電図検査・睡眠検査を オプションで追加できます。

ご質問・お申し出は、お気軽にどうぞ。



こうした身体の異常は
心臓のせいかも知れません。



こうした症状は、
S A S
睡眠時無呼吸症候群かも知れません。

当施設で採用の **コンパクトなホルター心電計** シャワーや半身浴もOK!

- 最長7日間の計測
- 30mm×100mm、12gのコンパクトタイプ




ピタリ!

貼るだけの
絆創膏タイプ

詳しくは裏面をご覧ください。 >

ホルター心電図検査って？

小型のホルター心電計を装着し、長時間(最長7日間)にわたって測定する心電図検査です。通常の短時間の健診では分かりにくい心臓の状態や変化を、より詳細に確認できます。当施設で採用のホルター心電計はコンパクトで、従来のホルター心電計のようにコードもなく、絆創膏を胸に貼り付ける感覚で気軽に使用できます。



心房細動の早期発見に!

心房細動が発症すると血栓ができやすくなり、脳梗塞の原因となります。


■ 自覚症状

めまい

動悸

胸痛

不快感



睡眠時無呼吸のリスク発見に!!

起床時の頭痛、大きないびきなどの原因となる睡眠時無呼吸症候群(SAS)。日中の眠気で居眠り運転を繰り返したり、様々な合併症を引き起こすといわれています。

■ 合併症

- ・心筋梗塞・脳血管障害
- ・高血圧
- ・夜間頻尿
- ・不整脈
- ・心不全
- ・腎障害も…

SAS患者の
高血圧のリスク

2.1倍



SAS患者の
メタボの合併率

2.8倍



SAS患者の
脳卒中のリスク

3.5倍



SAS患者の
交通事故リスク

2.4倍



参考文献

Mokhlesib, et al. Eur Respir J. 2016;47(4):1162-1169
Lancet Respir Med. 2015 April; 3(4): 310-318.
Stephen Tregear, et al. JCSM. Vol.5-6, 2009: 573-581.

胸に貼るだけの薄型ホルター心電計です。 装着したまま、普段と変わらない生活を送れます。

● 検査の流れ



① 詳細説明

検査の詳細な説明をいたします



② 心電計装着

当施設で心電計を装着します



③ ポスト投函

取り外した心電計を返信用封筒に入れポストに投函します



④ 検査結果受け取り

当施設より検査結果をお受け取り下さい

心電図検査

検査費用

円(税込み)

心電図検査+睡眠検査

検査費用

円(税込み)